

Grandes
Cultures

vertissements® agricoles auvergne

Bulletin technique N° **10** du **22/09/94**
Supplément n° 1

0263.2756

COLZA
 Limaces : Surveiller et intervenir.
 Grosses Altises : Risque limité.
 Tenthrèdes : A surveiller.
 Pucerons : Le point.
CEREALES
 Mosaïques : Sensibilité des variétés.
MAIS
 Pyrale : Enquête sur les dégâts.

COLZA

Stades - Levée (A) à 2 - 3 feuilles (B2 - B3).

LIMACES

★ Situation

Les conditions météorologiques actuelles sont favorables aux limaces et une activité très importante est notée depuis une dizaine de jours.

★ Préconisation

*Soyez très vigilant. Visitez très souvent vos parcelles.
 Attention pour celles qui lèvent actuellement.*

Pour détecter la présence des limaces, disposer des granulés anti-limaces sous une tuile, il suffit ensuite de dénombrer les cadavres.

Intervenir en fonction des risques (autant que de besoin).

PRODUITS : MALICE, MESUROL, SKIPPER et Spécialités à base métaldéhyde.

GROSSES ALTISES

★ Situation

L'activité demeure encore faible en ce début de campagne tant au point de vue captures en cuvettes jaunes que de l'importance des morsures sur les cotylédons.



Publication mensuelle
 Abonnement annuel : 230 Frs
 Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
 Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
 de la Protection des Végétaux
 Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
 Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

P128

★ Préconisation

Aucune intervention ne se justifie à ce jour dans l'ensemble.

Visiter très régulièrement vos cuvettes jaunes et observer l'importance des morsures sur les jeunes plantes.

RAPPEL DES SEUILS D'INTERVENTION

- Colzas de moins de 2 feuilles : 30 % des pieds avec des morsures.
- Colzas de plus de 2 feuilles : cumul de 20 à 30 altises dans votre cuvette jaune.

TENTHREDES

Surveillez attentivement les premiers dégâts de ces fausses chenilles noires qui peuvent dévorer très rapidement le feuillage.

Les pyréthrinoïdes sont efficaces.

PUCERONS

Le regroupement de 16 essais mis en place par les S.R.P.V. de 6 régions du Nord de la France de 1991 à 1994 montre que l'impact des infestations de pucerons sur **le rendement est relativement faible : 2,9 qx en moyenne**. La dispersion des résultats allant de 0 à + 7,9 qx implique néanmoins à une certaine prudence.

Le seuil d'intervention de 20 % de pieds colonisés n'est pas remis en cause.

CEREALES

MOSAÏQUES

★ Situation

Les mosaïques sont bien présentes en Auvvergne mais pour l'instant l'intensité des attaques demeure globalement faible.

- Sur blé : Une extension lente est cependant notée pour les 2 viroses inféodées au blé. Des symptômes ont encore été visibles ce printemps dans l'Allier et le Puy-de-Dôme.

- Sur orge : Il n'y a pas d'aggravation du problème. La maladie a été peu visible cette campagne. Cette virose a été observée par le passé dans l'Allier (1992).

★ Préconisation

Le choix d'une variété tolérante aux virus demeure l'unique méthode de lutte.

C'est au niveau de votre exploitation, par la connaissance de vos parcelles avec d'éventuels symptômes qu'il faut agir. Une analyse virologique effectuée au cours du printemps permet de confirmer tout diagnostic douteux (présence de ronds plus jaunes avec une végétation tassée courant montaison).

La liste ci-après vous aidera à choisir vos variétés en fonction de leur sensibilité aux mosaïques.